


การป้องกันควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้า

การดูแลและป้องกันในสัตว์เลี้ยง

- 1 พาหมาและแมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเข็มแรกเมื่ออายุ 2-3 เดือน และฉีดซ้ำทุกปี



- 2 ไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยงให้ออกไปนอกบ้านตามลำพัง เพื่อป้องกันไม่ให้ไปสัมผัสกับสัตว์ที่เป็นโรค



- 3 คุมกำเนิดหรือทำหมันสัตว์เลี้ยง เพื่อลดจำนวนสัตว์จรจัดที่อาจเป็นแหล่งแพร่เชื้อ



การฉีดวัคซีนป้องกันในคน

- 1 ไปพบแพทย์เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามกำหนดทุกเข็มทันที



- 2 กรณีมีความเสี่ยงสูง เช่น ผู้ที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ ควรรับวัคซีนป้องกันล่วงหน้าก่อนถูกกัด



การปฏิบัติเมื่อถูกสัตว์กัดหรือข่วน

- 1 รับล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่ ฟอกล้างอย่างละเอียดหลายๆ ครั้ง



- 2 ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น โพวิโดนไอโอดีน ที่แผล



- 3 ักดูอาการสัตว์ที่กัดเป็นเวลา 10 วัน หากสัตว์ตายหรือมีอาการผิดปกติ ให้รีบส่งตรวจหาเชื้อทันที

